

 **Rasilez**<sup>®</sup>  
alisquireno

 **DIOVAN**<sup>®</sup> TRIPLO  
valsartana + hidroclorotiazida + enalaprilato

14 DE SETEMBRO DE 2009

HORÁRIO: 13H10 ÀS 15H00

LOCAL: AUDITÓRIO 1

**SIMPÓSIO**  
**NOVARTIS**

**VIDA HIPERTENSA:**

**NOVAS ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA**

**DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES**

13h10 - 13h20 **Abertura**

Dr. Decio Mion

13h20 - 13h50 **Eficácia e Proteção Além da Redução em Milímetros de Mercúrio**

Dr. Gilson Feitosa

13h50 - 14h20 **Vida Hipertensa: abordagem de hipertensão arterial além dos milímetros de mercúrio**

Dr. Altamiro Costa

14h20 - 15h00 **Combinação Tripla: Um Novo Marco no Manejo da Hipertensão**

Dr. Decio Mion

Convite individual, pessoal e intransferível destinado à classe médica.

**RASILEZ<sup>TM</sup>** - alisquireno. Forma farmacêutica e apresentações: Comprimidos revestidos. Embalagens contendo 14 e 28 comprimidos revestidos de 150 ou 300 mg de alisquireno. Indicações: Tratamento da hipertensão. Posologia: 150 mg a 300 mg, uma vez ao dia, em monoterapia ou em combinação com outros agentes anti-hipertensivos. Contra-indicações: Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes. Precauções e Advertências: Não é recomendado durante a gravidez ou quando se planeja engravidar, e deve ser descontinuado caso isso aconteça. Após o início do tratamento, hipertensão raramente foi relatado. Supervisão médica rigorosa em pacientes com um sistema renina-angiotensina ativado (p. ex. pacientes com diálise de sódio e/ou volume). Deve-se ter cautela em pacientes com insuficiência renal grave, estenose da artéria renal, histórico de diálise, síndrome nefrótica ou hipertensão renovascular. Interações medicamentosas: Monitorar quando usado concomitantemente com furosemida. Interações com celastrol. Tratamento concomitante com medicamentos que podem aumentar os níveis de potássio sérico. Reações Adversas: Comum: diarreia. Incomum: erupção cutânea. Sérias/raras: angioedema. Resultados laboratoriais: redução de hemoglobina e hematócrito, aumento do potássio sérico. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.** Reg. MS: 1.0068.1065. Informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação. **DIOVAN<sup>®</sup> TRIPLO** (I), valsartana + hidroclorotiazida + besilato de antidiopina. Forma farmacêutica e apresentações: Comprimidos revestidos de valsartana + hidroclorotiazida de 160/12,5 mg ou 160/25 mg. Comprimidos de besilato de antidiopina de 5 mg ou 10 mg. Embalagem contendo 28 comprimidos revestidos de valsartana + hidroclorotiazida e 28 comprimidos de besilato de antidiopina ou contendo 14 comprimidos revestidos de valsartana + hidroclorotiazida e 14 comprimidos de besilato de antidiopina. Indicações: **DIOVAN TRIPLO** é indicado para o tratamento da hipertensão em pacientes que não foram adequadamente controlados com a valsartana associada à hidroclorotiazida ou com a valsartana associada ao besilato de antidiopina. Posologia: A dose diária recomendada para o tratamento da hipertensão é de **DIOVAN TRIPLO** (160/12,5 mg + 5 mg) uma vez ao dia. Nos pacientes que não apresentarem controle adequado da pressão arterial com a dose inicial diária recomendada, esta pode ser aumentada para **DIOVAN TRIPLO** (160/12,5 mg + 10 mg) ou **DIOVAN TRIPLO** (160/25 mg + 5 mg) ou **DIOVAN TRIPLO** (160/25 mg + 10 mg), uma vez ao dia. Contra-indicações: Hipersensibilidade aos componentes deste produto ou às sulfonamidas e diureticos. Gravidez, insuficiência hepática grave, insuficiência renal grave, insuficiência renal grave (clearance de creatinina < 30 ml/min), hipocalcemia refratária, hiponatremia e hipercalemia refratária, hiperuricemia sintomática. Precauções e Advertências: Valsartana + hidroclorotiazida: Risco de hipotensão em pacientes com depleção de sódio e/ou hipovolemia. Cautela em pacientes com estenose arterial renal, insuficiência renal ou hepática, lúpus eritematoso sistêmico e aqueles com distúrbios no balanço eletrolítico, na tolerância à glicose, nos lipídios e no ácido úrico. Antidiopina: Recomenda-se cautela em pacientes com insuficiência cardíaca; antidiopina foi associada com um aumento do relato de edema pulmonar em um estudo, apesar de não existir nenhuma diferença significativa em relação ao placebo. Insuficiência hepática: a meia vida de eliminação dos antagonistas do canal de cálcio é prolongada nestes pacientes e a posologia não está estabelecida. Portanto, cautela é recomendada. Pacientes pediátricos: a segurança e eficácia do antidiopina não foram estabelecidas. Gravidez e lactação: Não é recomendado o uso na gestação. Se ocorrer gravidez durante o tratamento, este deve ser descontinuado assim que possível. Não se recomenda o uso em lactantes, pois a hidroclorotiazida é excretada no leite humano. Interações medicamentosas: Tratamento concomitante com diuréticos poupadores de potássio ou suplementos de potássio podem elevar os níveis de potássio. Cautela se combinado com outros anti-hipertensivos, lítio (monitoramento de lítio sérico), curaméticos, antiarrítmicos não estromidais, diuréticos, depletors de potássio, carbamazepina, AC/H, amifostina, carbamazepina, penicilina G, derivados do ácido salicílico, albuterol, amantadina, ciclospolina, diltiazem, medicamentos ototóxicos, agentes anti-colinérgicos, metilopa, colestiramina, vitamina D, uso do cálcio, digoxina e carbamazepina (monitoramento de sódio sanguíneo). Reações Adversas: valsartana + hidroclorotiazida: Cefaleia, tontura, fadiga e síncope, hidroclorotiazida: hipocalcemia, hiperuricemia e outros desequilíbrios eletrolíticos, hipertensão ortostática e elevação dos lipídios. Raros: icterícia, arritmias, doenças sanguíneas. Muito raras: vasculite, pancreatite, pneumonite, edema pulmonar, reações de hipersensibilidade (como edema angioneurótico), insuficiência renal, mialgia e trombotocitemia. Ações laboratoriais: neutrofilos, elevação de creatinina e uréia sanguíneas. Antidiopina: Úlcera no estômago, dor abdominal, náusea, palpitações e síncope. Tripla combinação: edema gengival. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.** USO ADULTO. Reg. MS: 1.0068.1061. Informações completas para prescrição disponíveis mediante solicitação.

 **NOVARTIS**

SIC - Serviço de Informação ao Cliente  
0800 565 5105  
sic.novartis@novartis.com

Novartis Biocências S.A.  
www.novartis.com.br